

YURTIMIZDAGI XUSHBO'Y VA XUSHT'AM O'SIMLIKLER

Ibragimova Farida Ataboyevna

Yangiariq tumani 39-sonli IDUM Biologiya fani o'qituvchisi

O'zbekistonda xushbo'y va xusht'am o'simliklardan homashyo sifatida foydalanish, ularan efir moylarini ajratib olishni yo'lga qo'yish uchun barcha imkoniyatlar bor.Biz tabiiy holda o'sadigan efir moyli o'simliklardan to'g'ri va oqilona foydalanishni yo'lga qo'yishimiz bilan bir qatorda, qimmatbaho xom ashyo manbayi hisoblanadigan, yuqori sifatli efir moylarini beradigan limonli shuvoq, yorongul, yalpiz, mavrak, rayhon, arpabodiyon, kiyiko't, tog'rayhon, alkaro't, zira, sherolg'in kabi o'simliklarni ekinga aylantirsak, homashyo manmayi mustahkamlanar edi. Ulardan olinishi mumkin bo'lgan efir moylari va tayyorlangan mahsulotlar yuqori sifatli bo'lib, nafaqat mamlakatimiz standartiga hatto jahon standartlariga ham to'g'ri kelar edi. Bu yechimlar amalga oshirilsa, yuqori sifatli efir moylari tayyorlanib, ulardan turli –tuman mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalanilsa bu nafaqat ijtimoiy samaradorlikga ega bo'ladi blki iqtisodiy jihatdan ham foya beradi.Xushbo'y va xusht'am o'simliklar boyliklaridan foydalanganda o'simlik guruhlarining ekologik muvoznatiga ta'sir etmaslik uchun ularni yig'ishtirib olish va tayyorlash qoidalariга riosa qilinsa, o'simliklar orasidagi muvozanat buzilmaydi, balki ular yo'qotgan massalari qayta tiklanadi. O'simlik xom ashylarini yig'ishtirishda turlarni bilmaslik, ularning biologik xususiyatlarini hisobga olmaslik, unumli va oqilona foydalanmaslik xom ashyo uchun yig'ishtirilayotgan o'simlik turlari hamda boyliklariga katta zarar yetkazadi.Xushbo'y va xushtam o'simliklarning a'zolarida to'plangan efir moylarining miqdori ta'sir etuvchi omillarga bog'liq. Birinchi navbatda, o'simliklarning tarqalish rayoni o'sish sharoiti, rivojlanish davrlari, o'simlik guruhlari, tuproq va ob –havo sharoitlari quyosh yorug'ligining va nurlarining ta'siri hamda genetik jihatidan uzviy barqarorligi muhim ahamiyatga ega.Xushbo'y

va husht'am o'simliklar efir moyining sifatli hamda ta'sirchan bo'lish payti ko'pchilik o'simliklarning g'unchalash va gullash davriga to'g'ri keladi. Ana shu paytda o'simliklarning yerustki massalari yig'ishtirilib olinishi lozim. G'uncha va gullari to'liq yetilganda, urug'va mevalari esa to'liq pishganda, ildiz, ildizpoya, tugunak hamda piyozlari o'simlik o'sish dvrining oxirida, yani o'simlik uyquga ketishi oldidan yig'ishtirib olinadi. Xushbo'y va husht'am o'simlik boyliklaridan noo'rin foydalanishlik, ularning biologik xususiyatlarini hisobga olmaslik, yig'im terimni belgilangan muddatlarda tashkil etmaslik belgilangan rejadan ko'proq xom ashyo yig'ishtirish, boyliklarni noo'rin payhon qiluvchi shaxslarga yo'l ochibberish o'simlik turlarining yo'qolib ketishiga hamda boyliklarining qayta tiklanishiga zarar keltiribgina qolmasdan, ayrim o'simlik turlari yo'qolib ketishiga sabab bo'ladi. Shu sababli xushbo'y va xushtam o'simlik xom ashylarini tayyorlashda ilmiy asosda yaratilgan tadbir chora va qoidalarga to'liq amal etish kerak. Xushbo'y va xusht'am o'simliklar biologik aktiv moddalarga boy bo'libgina qolmasdan, balki fitonsitlik hamda antibakteriyasedlik xususiyatlariga ham egadirlar. Shu sababli ulardan oziq -ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda hamda tayyorlashda foydalanganda, oziq -ovqat mahsulotlari sifatida, ta'mini, to'yimlilagini, organizmda tez hazm bo'lishini ta'minlabgina qolmasdan, balki ularni tez aynib qolishdan, saqlaydi. Ziravorlangan oziq -ovqat mahsulotlari tarkibida turli vitaminlar, xushbo'y, juda ham yoqimli efir moylari, turli xil organik kislotalar karbon suvlar, oshlovchi moddalar, mikro va makro elementlar, fitonsit hamda bakterisit moddalari bo'ladi. Bunday biologik aktiv moddalar bilan boyigan oziq ovqat mahsulotlari ishtaha bilan tanovvul etiladi hamda osonlik bilan hazm bo'ladi. Natijada inson organizimida modda almashinuv jarayoni yaxshilanadi, turli kasalliklarga bo'lgan qarshiligi kuchayadi. Hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladigan xushbo'y va xushtam o'simliklardan zira, oq zira, qora zira, kariandr, karafs, qizil va achchiq qalampir, yer qalampir, rayhon, tog'rayhon, yalpiz, kiyiko't, limo'no't, mavrak, sarimsoq piyoz, qarqand, jambil, zanjabil, zarchava,

yerchoy, tog'jambili vabir qancha ko'plab boshqa o'simliklar ishlatiladi. Tog'jambili: sershox, pastbo'yli (10 –15) cm chala butalardan iborat, mayda, teskari tuxumsimon yoki lansetsimon qarama –qarshi joylashgan. Gul mayda pushti va qizg'ish hushbo'y. Mevasi kosachabarglari bilan qo'shilib o'sgan 4 ta yong'oqcha. O'zbekistonda 2 ta turi bor. Tog'jambili yozning boshlarida gullab oxirida meva qiladi. U efir moyli va shirali o'simlik bo'lib xalq tabobatida ishlatiladi. Limo'no't:ikkiuyli chirmashib o'sadi bargi qizil cho'ziq tuxumsimon, o'tkir uchli, cheti kungurali bandli ketma –ket guli bir jinsli, oq yoki pushti xushbo'y. Mevasi 1-2 urug'li, dumaloq, qizil, limon mazasi va hidi bor. Mevasi va urug'i tarkibida limon, olma va boshqa organik kislotalar uglevodlar vitamin C , efir moylari va boshqa darmon dorilar mavjud. Limo'no'tning kukuni aqli va jismoniy charchaganda mehnat qilish va ko'rish qobiliyati susayganda markaziy nerv sistemasi faoliyatini kuchaytiruvchi shuningdek yurak –tomir sistemasi va nafasni yaxshilovchi vosita sifatida ishlatiladi. Yechoy: Ranodoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't, bo'yi 45 cm. Gullari sariq mevasi murakkab pista. Yerchoyning yerostki qismi tarkibida gein gliozidi, 0,42 % gacha efir moyi 36 % dan ortiqroq oshlovchi moddalar organik kislotalar va boshqalar bor. Yerchoy xalq tabobatida tish kasalliklarini davolash va og'riqni qoldirishda, damlamasi meda –ichak kasalliklarin davolashda ishlatiladi. Jambil: Labguldoshlar oilasiga mansub 1 yillik xushbo'y o'simlik. O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarda ziravor o'simlik sifatida ekiladi. Bo'yi 20 –30 cm poyasi yuqori qismidan. Poyasi yuqori qismidan shoxlaydi, barg chetlari tekis etli. Gullari pushti, boshoqsimon to'pgullarga yig'ilgan poy va shoxlarining uchida joylashgan. Jambil atir-upa sanoatida va meda ichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi.